










	MALADIES					kg ou lt/ha	 A faire par le vigneron	 Effectué par hélicoptère	DATES ET REMARQUES	
	Excoriose	Rougeot	Oïdium	Mildiou	Botrytis					
 09 Feuilles étalées	●	●		●		1.0 3.0	FOLPET® + THIOVIT® JET	Effectué par hélicoptère	8 – 10 JOURS AVANT HÉLICO SI ANNÉE PRÉCOCE	
 15 Grappes séparées		●	●	●		Adapté à la végétation			RIDOMIL® VINO + TOPAS® VINO + MICROTHIOL	FULLY OUEST: 15 MAI FULLY EST / SAXON: 18 MAI FULLY HAUT / CHARRAT: 19 MAI
 23 Floraison		●		●			25.0	 POUDRAGE à faire par le vigneron de suite après fleur	ZONE DES GRAPPES	+ RIDOMIL® VINO + VIVANDO® + MICROTHIOL
 29 Nouaison			●			3.2 0.15 4.0				MIKAL® + RONDO SKY= SERCADIS MICROTHIOL
 33 Fermeture des grappes			●	●		4.0 0.15 4.0	PERGADO® + SERCADIS + MICROTHIOL	FULLY OUEST: 22 JUIN FULLY EST / SAXON: 24 JUIN FULLY HAUT / CHARRAT: 25 JUIN		
			●	●	●	1.2 2.4 0.6	FILAN® + PERGADO® + DYNALI®	 à faire par le vigneron au stade petit pois, zone des grappes		
			●	●		4.0 0.32 4.0		PERGADO® + LEGEND® + MICROTHIOL	FULLY OUEST: 6 JUILLET FULLY EST / SAXON: 7 JUILLET FULLY HAUT / CHARRAT: 8 JUILLET	
			●			0.32	<i>Selon météo</i>	MILDICUT ou FOLPET+CUIVRE + VIVANDO®	FULLY OUEST: 20 JUILLET FULLY EST / SAXON: 21 JUILLET FULLY HAUT / CHARRAT: 22 JUILLET	
			●			3.0 0.32		CUIVRE® 50 + LEGEND® Total Cu: 2.25 kg/ha	FULLY OUEST: 10 AOÛT FULLY EST / SAXON: 11 AOÛT FULLY HAUT / CHARRAT: 12 AOÛT	

Le vigneron a la responsabilité de la maîtrise des maladies et des parasites dans ses vignes. Il doit surveiller ses vignes et communiquer, sans délai, toute erreur d'application ou développement parasitaire aux responsables du groupement.